

弱視應及早治療

懶惰眼也叫作弱視，由於兒童發育期間，大腦的視覺功能發育不健全而引起。弱視患者的眼球正常，但弱視是無論看遠或近的景物都模糊不清，即使配戴眼鏡或其他任何方法都不能令患者回復正常的視力水平。

弱視是因為在幼年時期，眼睛的視力發育不良而引起，所以成年人不會突然患有弱視。只是年幼時只是一直都沒有發現，直至接受眼科檢查時才發現。弱視主要是屈光不正所致，深遠視、深近視、深散光、或兩眼度數鴛鴦均為高危者。因為他們會傾向使用度數較淺的那隻眼睛，所以不容易察覺視覺出現問題，因而延誤診治。

此外，患有斜視、眼瞼下垂的小朋友，亦較易患上弱視。斜視是指雙眼不能同時注視同一目標，所以在觀察事物時，傾向使用其中一隻眼睛，長此下去，逐漸地造成另一隻眼使用次數減少、如果沒有及時得到適當的治療，可演變成弱視。

處理弱視的方法：

1) 矯正視力問題

若果因為屈光不正而引起弱視，首先要戴合適的眼鏡矯正眼睛度數。

2) 遮眼治療

如果戴眼鏡後，弱視眼的視力仍然未如理想，便需要遮眼治療。做法是使用眼罩將好眼遮蓋，促進弱視那隻眼睛的視力發育。



由於八歲前是兒童視力發展的黃金期，若果錯過了治療的黃金時間，弱視便不能再矯正。在日常生活上，家長或照顧者較難察覺孩子的視力問題。透過視力普查，可及早發現視力異常的兒童，以便安排轉介及治療，有助他們將來的視力及視覺發展。

香港醫務所

香港中環皇后大道中18號，新世界大廈第二期10樓
電話：25266198
傳真：28109477

九龍醫務所

九龍旺角彌敦道700號10樓
電話：23811614
傳真：23971860

定期更新公司最新動向
每日為您送上護眼小貼士



f hkoa1974



hkoa1974