



白內障會不會翻發

白內障是指眼睛內原本透明的水晶體變得混濁，看東西時像起霧的玻璃一樣模糊不清、視物色彩變黃等症狀。大部分患者在接受白內障手術後視力都有改善，不過有部分病人在手術數月或數年後，視力再次變差，便以為是白內障翻發。

白內障術手術是摘除硬化了的晶狀體，然後置入新的人工晶體。手術期間會移除部分前囊膜，並保留後囊膜以承托人工晶體，將交換的晶體放到最接近人體原來自然位置。

在大部分情況下，手術後的人工晶體都可終生使用。不過後囊膜或會隨着時間出現白化，只需要接受YAG激光治療便可以解決了。病人並不需要如白內障手術般移除晶體。後囊白化的治療方法是透過激光，於後囊膜中央位置刺穿一個開口，讓光線能再穿透晶體並投射到視網膜上，視力便得以改善。

激光治療只需滴麻醉藥水，通常於數十分鐘內便能完成，而且表面不存在任何傷口。當天可以用眼而不必遮蓋，完成治療後一周內需使用消炎眼藥水。

提提大家曾經接受白內障手術的患者仍應戴遮陽帽、太陽眼鏡保護眼睛，同時也須要定期進行眼底檢查。

