



雙眼皮手術

HKOA

since 1974

OA 眼科
The Hong Kong
Ophthalmic Associates

雙眼皮手術

眼睛是靈魂之窗，擁有雙眼皮的人，容易給人一種親切、充滿神采的感覺，而且在視覺上，雙眼皮會令眼睛看起來較大，亦改變了眉毛同眼睛之間的視覺比例。

雙眼皮的形成主要視乎上瞼提肌的組織有否連繫到皮膚上。女性的雙眼皮位置也一般較男性的高。年紀漸大，眼皮變得鬆弛，輕微的看起來沒甚精神；嚴重的甚至會遮蔽上方的視野範圍或視線。

當我們張開眼睛的時候，上眼皮便自然的上提和縮短，在天生雙眼皮的眼睛，因為眼睛上蓋底下的上提肌肉是連接到眼皮褶痕處的，所以眼皮便會在雙眼眇的位置對摺，形成薄薄的雙眼皮。



相反單眼皮的眼睛，上提肌肉沒有連接到眼皮褶痕處，而是連接到眼睫毛處，所以眼睛張開時眼皮便會向內摺。

縫線式雙眼皮手術


視乎個人選擇及身體狀況，一般手術都在局部麻醉下進行。

醫生會於雙眼眼皮上方畫上三個小孔位置，以確定合適客人的雙眼皮摺痕位置。

確定後，以縫線縫起小孔，形成雙眼皮。



手術前



手術後

適合人士

- 眼皮薄
- 眼皮脂肪少
- 眼皮鬆弛下垂不嚴重

雙眼皮手術

眼睛是靈魂之窗，擁有雙眼皮的人，容易給人一種親切、充滿神采的感覺，而且在視覺上，雙眼皮會令眼睛看起來較大，亦改變了眉毛同眼睛之間的視覺比例。

雙眼皮的形成主要視乎上瞼提肌的組織有否連繫到皮膚上。女性的雙眼皮位置也一般較男性的高。年紀漸大，眼皮變得鬆弛，輕微的看起來沒甚精神；嚴重的甚至會遮蔽上方的視野範圍或視線。

當我們張開眼睛的時候，上眼皮便自然的上提和縮短，在天生雙眼皮的眼睛，因為眼睛上蓋底下的上提肌肉是連接到眼皮褶痕處的，所以眼皮便會在雙眼眇的位置對摺，形成薄薄的雙眼皮。



相反單眼皮的眼睛，上提肌肉沒有連接到眼皮褶痕處，而是連接到眼睫毛處，所以眼睛張開時眼皮便會向內摺。

縫線式雙眼皮手術


視乎個人選擇及身體狀況，一般手術都在局部麻醉下進行。

醫生會於雙眼眼皮上方畫上三個小孔位置，以確定合適客人的雙眼皮摺痕位置。

確定後，以縫線縫起小孔，形成雙眼皮。



手術前



手術後

適合人士

- 眼皮薄
- 眼皮脂肪少
- 眼皮鬆弛下垂不嚴重



手術前準備

- 如果你有其他內科疾病、或服用阿士匹靈、薄血丸或需要長期服中藥、西藥或健康食品等，你必須預早知會醫生。
- 手術前1晚淋浴時，請將預定手術部位清洗乾淨。
- 手術前3天勿抽煙或喝酒



手術後應注意事項

- 手術後應多休息，不可用太多眼力：如看電視、打電腦、看書。
- 手術後3天在眼皮位置冰敷，睡覺時頭部墊高，以減輕腫脹情況。
- 雙眼皮部位出現瘀血、腫脹和瘀傷是正常的，但只會維持7-10天。
- 手術後2星期內，請避免配戴隱影眼鏡、劇烈運動、照射猛烈太陽或游泳。

HKOA

since 1974

OA 眼科
The Hong Kong
Ophthalmic Associates

電話：23811614(九龍) 25266198(香港)

電郵：hkoa@eyehealth.com.hk

網址：www.eyehealth.com.hk

WeChat：HKOA矯視護眼專家

Facebook：www.facebook.com/hkoa1974

Instagram：www.instagram.com/hkoa1974



此份指南的內容只供參考，如有疑問，請向您的眼科醫生查詢。